

お詫びと訂正

弊社刊行の『最新 介護福祉士養成講座 12 発達と老化の理解 第2版』の本文中、以下の箇所に誤りがございました。お詫びして、訂正させていただきます。(2023年12月1日更新)

該当頁	該当箇所	誤	正	備考
63 頁	上から 5 行 目	コ ー ル バ ー グ (Kolberg,L.)	コ ー ル バ ー グ (Kohlberg,L.)	2023/12/1 更新
64 頁	表 2-9 中、 出典の 1 行 目	Kolberg,L.	Kohlberg,L.	
86 頁	側注	④エイジズム pp.172-173 参照	④エイジズム pp.171-173 参照	
137 頁	表 4-2 中、 「身体機能 の変化」欄 の下から 9 ～8 行目	(ラセン器や基底膜の 弾性変化	(ラセン器や基底膜)の 弾性変化	
249 頁	下から 1 行 目	腎嚢胞などです。	嚢胞腎などです。	2023/1/25 更新
256 頁	下から 11 ～7 行目	日本生活習慣予防協会 によると、30～40歳代 男性の 3 割が高尿酸血 症で、痛風の 37%はメ タボリックシンドロ ームで、尿酸値 が 9 % だと、6 %未満に比べ て、5 年間の痛風発作発 症率が 40 倍になり、 尿酸値 10%以上だと、 6 %未満に比べて、5 年 間の痛風発作発症率が 60 倍になると報告され ています。	日本生活習慣病予防協 会によると、30～40歳代 男性の 3 割が高尿酸血 症で、痛風患者の 37% はメタボリックシンドロ ームで、尿酸値 が 9 mg/dl 台だと、6 mg/dl 未 満に比べて、5 年間の痛 風発作発症率が 40 倍に なり、尿酸値 10 mg/dl 以上だと、6 mg/dl 未満に 比べて、5 年間の痛風発 作発症率が 60 倍になる と報告されています。	

284 頁	図 5-36 中、 「暑い日 の外出」の 上から 1 行 目	<u>「じゅうほう高温注意情報」</u> に注 意。	<u>「じゅうけいかい熱中症警戒アラート」</u> に注意。	2023/1/25 更新
-------	--	--	--	-----------------